

СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ НОВОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО ЦИППЕИТА

А. Макаров

Магистрант, химический факультет

Научный руководитель – **проф. Л.Б. Серезкина**

Одним из важных и малоизученных классов природных минералов урана являются сульфатосодержащие: циппеиты. Изучение сути физико-химических процессов, протекающих в водно-солевых системах, содержащих ионы UO_2^{2+} и SO_4^{2-} , и поиск взаимосвязи между составом и строением образующихся соединений необходимы для совершенствования технологических процессов извлечения урана из руд.

При взаимодействии в системе $\text{UO}_2(\text{OH})_2 - \text{C}_3\text{H}_4\text{O}_4 - \text{Cs}_2\text{SO}_4 - \text{H}_2\text{O}$ в условиях гидротермального синтеза ($T = 110^\circ\text{C}$, $\tau = 24$ ч) образуется новый синтетический циппеит состава $\text{Cs}_3[(\text{UO}_2)_4(\text{SO}_4)_2(\text{O})_3(\text{OH})] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ (I). Методом рентгеноструктурного анализа изучено строение I. Все атомы урана находятся в общих позициях, и их координационные числа равны 7. Координационными полиэдрами атомов урана являются пентагональные бипирамиды UO_7 с атомами кислорода ионов UO_2^{2+} в аксиальных позициях. Сульфат-анионы выступают по отношению к атомам урана в качестве тетрадентатного лиганда (тип координации Q^4). Гидроксогруппы и оксогруппы выступают в качестве монодентатного мостикового лиганда (тип координации M^3). Основными урансодержащими структурными единицами I являются слои состава $[(\text{UO}_2)_4(\text{SO}_4)_2(\text{O})_3(\text{OH})]^{3-}$, связанные посредством электростатического взаимодействия с внешнесферными катионами цезия и водородных связей в каркас. Установлены параметры предполагаемых водородных связей в структуре соединения.

Проведено ИК спектроскопическое исследование I. Установлены в спектре характеристические полосы поглощения, соответствующие колебаниям групп UO_2^{2+} , SO_4^{2-} , OH^- и молекул воды.

АКРИЛАТОУРАНИЛАТЫ ЦЕЗИЯ – СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

О. Сергеева

4 курс, химический факультет

Научный руководитель – **проф. Д.В. Пушкин**

Были синтезированы и структурно изучены новые акрилатные комплексы уранила, содержащие во внешней сфере катион цезия – $\text{Cs}[\text{UO}_2(\text{CH}_2\text{CHCOO})_3]$ (I) и катионы цезия и бария – $\text{CsBa}[\text{UO}_2(\text{CH}_2\text{CHCOO})_3]_4$ (II). Полученные соединения были исследованы